



ਲਏ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਪਭੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪੇਯ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ 2 ਡ੍ਰਿੰਕ ਪੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਪੂਰਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ "ਪੰਪ ਅੱਡੇ ਡੰਪ ਕਰਨਾ" ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

### ਐਫ ਏ ਐਸ ਡੀ (FASD) ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਨਿਆਹੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਫ ਏ ਐਸ ਡੀ (FASD) ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਾ ਐਫ ਏ ਐਸ ਡੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚਿੱਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

### ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚਲੇ ਸਮਾਜਕ ਵਸੀਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ (Key Workers) – ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੱਝ ਐਫ ਏ ਐਸ ਡੀ (FASD) ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਪੇਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟ (Parent Support) - ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੇਨਟਰਿੰਗ (mentoring), ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ/ਨਾਨੀ ਲਈ ਐਫ ਏ ਐਸ ਡੀ (FASD) ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਕੁਝ ਭਾਈਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਫ ਏ ਐਸ ਡੀ (FASD) ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁਪ ਹਨ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ,

[www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/child-behaviour-development/special-needs/fetal-alcohol-spectrum-disorder-fasd](http://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/child-behaviour-development/special-needs/fetal-alcohol-spectrum-disorder-fasd) ਤੇ ਫੀਟਲ ਅਲਕੋਹਲ ਸਪੋਕਟਰਮ ਡਿਸਾਰਡਰ (ਐਫ ਏ ਐਸ ਡੀ) ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ, [www.healthlinkbc.ca/find](http://www.healthlinkbc.ca/find) ਤੇ ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ **8-1-1** ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

### ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਕਨੈਡੀਅਨ ਐਫ ਏ ਐਸ ਡੀ ਰਿਸਰਚ ਨੈਟਵਰਕ (ਕੈਨ ਐਫ ਏ ਐਸ ਡੀ) ਐਫ ਏ ਐਸ ਡੀ ਤੱਥ ਸੀਟ (Canadian FASD Research Network (CanFASD) FASD Fact Sheet)

<https://canfasd.ca/media/fasd-fact-sheet/>

ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਫ ਔਬਸਟੈਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟਸ ਐਂਡ ਕਲੇਡਾ (The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC))

ਸ਼ਰਾਬ – ਗਰੁਦ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਹੈਲਥਲਿੰਕਬੀਸੀ ਡਾਇਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, [www.HealthLinkBC.ca/healthfiles](http://www.HealthLinkBC.ca/healthfiles) ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਨ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, [www.HealthLinkBC.ca](http://www.HealthLinkBC.ca) ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ **8-1-1** (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬਹਿਰੇ ਅਤੇ ਉਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ, **7-1-1** ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।