

غاز الرادون في المنازل والمساكن الأخرى

Radon in homes and other dwellings

ما هي الإرشادات الخاصة بمستويات الرادون؟

إرشادات وزارة الصحة الكندية الحالية بشأن الرادون هي 200 بيكريل/م³. إذا تجاوز متوسط تركيز الرادون السنوي في المسكن 200 بيكريل/م³, توصي وزارة الصحة الكندية بالمعالجة. يقصد بالسكن المنازل والأماكن الأخرى التي يقضى فيها الناس 4 ساعات أو أكثر. يوصي معالجة التركيزات الأعلى في وقت أسرع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع وزارة الصحة الكندية: الرادون

www.canada.ca/en/health-canada/services/health-risks-safety/radiation/radon.html

هل يوجد الرادون في بريتش كولومبيا؟

نعم، تواجد مستويات مرتفعة من غاز الرادون في معظم أنحاء المقاطعة، ولكن تُعرف بعض المناطق بوجود تركيزات أعلى بشكل عام. أظهرت نتائج لعينات في مسح حديث أجرته وزارة الصحة الكندية في أنحاء البلد لتركيزات غاز الرادون أن نسبة المنازل في مناطق الهيئات الصحية الشمالية والداخلية (نورثرن وانتيوريور) التي أبلغت عن مستويات رادون أعلى من 200 بيكريل/م³ تتراوح من 6 إلى 30%. ما يزال من الممكن أن تكون مستويات الرادون مرتفعة في المنازل في أجزاء أخرى من المقاطعة ولكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات والإبلاغ عنها.

لمزيد من المعلومات حول مستويات الرادون في بريتش كولومبيا، تفضل بزيارة <https://bccdc.shinyapps.io/bcradonmap>.

هل يتطلب اختبار منزلي؟

يُفضل للجميع اختبار منازلهم للكشف عن غاز الرادون.

تحتختلف مستويات غاز الرادون بشكل كبير من منزل إلى آخر، حتى في نفس الحي. وذلك لأن التركيزات في المبني تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك جيولوجيا المنطقة وبناء المساكن وخصائص مثل تبدل الهواء في المنزل. بشكل عام، تميل تركيزات غاز الرادون لأن تكون الأعلى في الطوابق السفلية للمبني، مثل الأقبية.

الطريقة الوحيدة للتتأكد من تركيز غاز الرادون في منزلك هي الاختبار. نحن سكان مجتمعات المناطق الداخلية والشمالية (انتيوريور ونورثرن) في بريتش كولومبيا بشكل خاص على اختبار منازلهم للكشف عن غاز الرادون.

كيف أختبر منزلي؟

اختبار الرادون أمر سهل ويمكن إجراؤه باستخدام اختبارات التنفيذ الذاتي. تبلغ تكلفة جهاز الاختبار والناتج حوالي 30 إلى 50 دولارًا.

ما هو الرادون؟

الرادون هو غاز مشع عديم اللون والرائحة ينبعث من تحلل اليورانيوم المتواجد بشكل طبيعي في الصخور والترية والمياه الجوفية. عند انتشاره في الهواء الطلق، يخف تركيز غاز الرادون في الهواء ولا يشكل خطراً كبيراً. إلا أنه يمكن لغاز الرادون أن يترافق داخل المنازل والمباني الأخرى ويشكل خطراً على صحتك.

يدخل الرادون المبني بشكل أساسى من خلال التربة أسفل المبنى. ويمكن أن ينتقل عبر الشقوق في الأساسات ومفاصل البناء، وكذلك الفجوات حول أنابيب الخدمة ومصارف الأرضيات وإطارات النوافذ.

كيف يؤثر الرادون على صحتي وما الخطير على؟

قد يسبب التعرض للرادون على المدى الطويل سرطان الرئة. حوالي 16% من حالات الوفاة بسرطان الرئة في كندا ترجع إلى التعرض للرادون في الأماكن المغلقة. الرادون هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة لغير المدخنين والسبب الثاني بين المدخنين. هناك احتمال واحد من ثلاثة لإصابتك بسرطان الرئة في حياتك إذا تعرضت لمستويات عالية من الرادون و كنت تدخن حالياً أو سابقاً. بالنسبة لغير المدخنين، فإن الخطير هو واحد من 20.

نظرًا لطول الوقت الذي يستغرقه تطور سرطان الرئة، فإن خطر الإصابة بسرطان الرئة بسبب الرادون يعتمد على تركيزه في الهواء الداخلي للمنزل أو المبني وطول فترة التعرض. ولعدم ظهور أعراض فورية للتعرض للرادون، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إن كنت معرضاً له هي اختبار ما إن كان منزلك يحتوي على الرادون. يجب المعالجة إذا عُثر على مستويات أعلى من الإرشادات الموصى بها أدناه. المعالجة هي عملية تقليل كمية الرادون في المنازل والمباني الأخرى.

كيف يُقاس الرادون؟

يُقاس الرادون في الهواء ببيكريل في المتر المكعب (بيكريل/م³)، وهو مقياس للتحلل الإشعاعي في الثانية. في الأماكن المغلقة، يمكن قياس الرادون باستخدام اختبارات طويلة الأمد (3 أشهر إلى عام) واختبارات قصيرة الأمد (2 إلى 7 أيام).

يوصى بالاختبارات طويلة الأمد لتوفير قياس دقيق لتركيزات الرادون في المنزل أو المبني. من السهل إجراء الاختبار طويل الأمد ويمكن القيام به باستخدام مجموعات اختبار الرادون للتنفيذ الذاتي. تحتوي هذه المجموعات على أجهزة صغيرة للكشف عن الرادون ثبتت على الحائط وتوضع في المنزل لمدة 3 أشهر أو أكثر، ويفضل أن يكون ذلك خلال فصل الخريف أو الشتاء (يوصى بفترة تتراوح من 6 إلى 12 شهراً). نظرًا لإمكانية اختلاف مستويات الرادون بشكل كبير على مدار فترة 24 ساعة، فلا ينصح بإجراء الاختبارات قصيرة الأمد (2 إلى 7 أيام).

ماذا يمكنني أن أفعل إذا أظهرت الاختبارات أن منزلي يحتوي على مستويات مرتفعة من الرادون؟

هناك عدة أمور يمكنك القيام بها لتقليل مستويات الرادون في منزلك:

- تهوية الأرضية السفلية للقبو عن طريق تركيب مضخة هواء صغيرة لسحب الرادون من أسفل البلاطة الخرسانية وتنفيسيه خارج المنزل قبل أن يدخل المنزل أو المبني
 - تحسين التهوية أو تدفق الهواء (شكل طبيعي أو قسري) للمساحات ذات السقف المنخفض والأقبية والمناطق الأخرى في الطوابق السفلية من المنزل أو المبني عن طريق فتح النوافذ أو استخدام مراوح السقف
 - سد الشقوق والفتحات في أرضيات وجدران القبو وحول الأنابيب والمصارف
- يتوفر متخصصون معتمدون في مجال تخفيف غاز الرادون لتقديم المشورة والمعالجة. للعثور على متخصص في مجال الرادون في منطقتك، قم بزيارة برنامج الكفاءة الوطنية الكندية للرادون (C-NRPP) على <https://c-nrpp.ca> أو الرابطة الكندية لعلماء وتقني الرادون على www.carst.ca. بعد اكتمال المعالجة، يجب إجراء اختبار آخر للرادون للتأكد من خفض المستويات.

مزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمسؤول الصحة البيئية في هيئة الصحة المحلية في منطقتك من خلال زيارة www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-system/health-care-system/partners/health-authorities/regional-health-authorities

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

- اتخاذ إجراءات ضد الرادون

<https://takeactiononradon.ca>

• مركز مكافحة الأمراض في بريتش كولومبيا: خدمات الصحة البيئية www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/radon

• مركز التعاون الوكني للصحة البيئية (NCCEH)

<https://ncceh.ca>



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

يوضع جهاز كشف الرادون طوبل الأمد في الطابق الأسفل في منزلك الذي يُقضى فيه وقت يتراوح بين 4 ساعات يومياً. تُقدم تعليمات محددة مع جهاز الكشف.

بمجرد اكتمال الاختبار (من الناحية المثالية على مدى فترة من 3 أشهر إلى عام واحد، بما في ذلك بعض أشهر الشتاء)، يُرسل جهاز الكشف إلى مختبر للتحليل. يقدم المختبر بعد ذلك نتائج الاختبار، على شكل تركيز متوازن للرادون خلال فترة الاختبار. يمكن بعد ذلك مقارنة هذا المستوى بإرشادات وزارة الصحة الكندية البالغة 200 بيكريل/م³. نظراً لعدم اعتبار أي مستوى من الرادون خالياً من الضرر، يوصى بالنظر في المعالجة، حتى لو كانت المستويات قريبة من الإرشادات أو أقل منها.

أين يمكنني الحصول على جهاز اختبار الرادون؟

للحصول على قائمة بموردي أجهزة اختبار الرادون، تفضل بزيارة موقع مركز مكافحة الأمراض في بريتش كولومبيا

www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/EH/RPS/Radon%20Testing%20in%20Cda.pdf (PDF 220 KB)

ابحث تحت بند "خدمات فحص المنازل home inspection" في قوائم الهواتف المحلية لديك.

تتوفر أيضاً مجموعات الاختبار من:

• **BC Lung Foundation** (مؤسسة الرئة في بريتش كولومبيا)
الرادون – اتصل بالرقم (5864) 1-800-665-LUNG أو اتصل بالدكتور Noah Quastel عبر nquastel@bclung.ca أو 778-709-4496

• هيئة نورثن الصحية – اتصل بالرقم 2150-565-250، الهاتف المجاني 1-800-663-7867 أو عبر البريد الإلكتروني radon@northernhealth.ca

• جمعية دونا شميدت ميموريال للوقاية من سرطان الرئة – اتصل بالرقم 44-365-0344، تحويلة 227 أو عبر البريد الإلكتروني dschmidt@golder.com. ملاحظة: تقتصر مجموعات الاختبار على المواقع في كوتينيز

يمكنك أيضاً الدفع لمتخصص معتمد في قياس الرادون ليأتي ويخبر منزلك. تعرف وزارة الصحة الكندية ببرنامج الكفاءة الوطنية الكندية للرادون. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة <https://c-nrpp.ca>.