

لقاح المكورات الرئوية العديد السكريد Pneumococcal polysaccharide vaccine

• الداء السكري، أو التليف الكيسي، أو التسرب المزمن للسائل الدماغي الشوكي

• حالة عصبية مزمنة تجعل من الصعب عليهم إخراج السوائل من الفم أو الحلق

• اضطراب تعاطي الكحول

• التشرد

• تعاطي المخدرات غير المشروعة

يُوصى بأخذ جرعة ثانية من اللقاح لمن يعانون من حالات مرضية معينة. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك لمعرفة ما إن كنت بحاجة إلى جرعة ثانية ومتى ينبغي عليك تلقيها.

من المهم أن تحتفظ بسجل لجميع اللقاحات التي تحصل عليها.

ما هي فوائد لقاح المكورات الرئوية العديد السكريد؟

يقي اللقاح من عدوى المكورات الرئوية، وهي مرض خطير، بل ومميت في بعض الأحيان. عندما تتلقى اللقاح، فإنك تُساعد بذلك في حماية الآخرين أيضًا.

ما هي التفاعلات المحتملة بعد تلقي اللقاح؟

اللقاحات آمنة جدًا. الحصول على اللقاح أكثر أمانًا بكثير من الإصابة بمرض المكورات الرئوية.

قد تتضمن التفاعلات الشائعة للقاح وجود ألم واحمرار وانتفاخ في مكان الحقن. وقد تحدث كذلك إصابة بحمى خفيفة. هذه التفاعلات خفيفة وتستمر عادة لمدة يوم أو يومين.

لمزيد من المعلومات حول متلازمة راي، يرجى زيارة [HealthLinkBC ملف #84 متلازمة راي](https://www.healthlinkbc.ca/84#متلازمة-راي).

من المهم البقاء في العيادة لمدة 15 دقيقة بعد تلقي اللقاح. هناك احتمال ضعيف جداً لحصول رد فعل تحسسي مهدد للحياة يسمى التأق (فرط الحساسية). يحدث ذلك لأقل من 1 في المليون ممن يتلقون اللقاح. قد تشمل الأعراض حدوث

خلال الخمسين عامًا الماضية، أنقذ التطعيم في كندا أرواحًا أكثر من أي إجراء آخر.

ما هو لقاح المكورات الرئوية العديد السكريد؟

يقي لقاح المكورات الرئوية العديد السكريد من 23 نوعا من أنواع بكتيريا المكورات الرئوية، وهو مصرح به من قبل وزارة الصحة في كندا.

لا يندرج لقاح المكورات الرئوية العديد السكريد في جدول اللقاحات الروتينية لتحصين الأطفال. لمزيد من المعلومات حول اللقاح الروتيني للمكورات الرئوية للأطفال، تفضل بزيارة [ملف HealthLinkBC رقم a62 لقاح المكورات الرئوية](https://www.healthlinkbc.ca/a62-لقاح-المكورات-الرئوية) [المقترن \(PCV 13\)](https://www.healthlinkbc.ca/pcv13)

من الذي ينبغي عليه تلقي اللقاح؟

يُقدّم اللقاح مجاناً للأشخاص المعرضين بشدة لخطر الإصابة بعدوى المكورات الرئوية، مثل:

- كبار السن في عمر 65 عاماً فأكثر
- نزلاء مرافق الرعاية طويلة الأجل ومرافق المساعدة على المعيشة
- يُقدّم اللقاح مجاناً كذلك لأي شخص يبلغ من العمر سنتين أو أكثر، ويعاني من الحالات التالية:
- عدم وجود طحال، أو يوجد طحال ولكنه لا يعمل جيداً
- فقر الدم المنجلي
- ضعف الجهاز المناعي بسبب مرض أو علاج طبي
- مرض مزمن في الكبد، بما في ذلك تليف الكبد أو التهاب الكبد الوبائي B أو C المزمن
- مرض مزمن في الكلى أو في القلب أو الرئة
- زراعة خلايا الجزيرات البنكرياسية أو أعضاء صلبة، أو قوقعة الأذن (الأذن الداخلية)، أو في انتظار إجراء الزراعة
- زراعة خلايا جذعية

موافقة القاصر الناضج

يُنصح بأن يناقش الأهالي أو أولياء الأمور أطفالهم حول الموافقة على التطعيم. الأطفال الذين لم يبلغوا 19 عامًا، والذين يمكنهم فهم فوائد كل لقاح والتفاعلات المحتملة له وخطورة عدم أخذه، يمكنهم قانونيًا الموافقة على التطعيم أو رفضه.

لمزيد من المعلومات حول موافقة القاصر الناضج، يُرجى زيارة ملف [HealthLinkBC رقم 119 قانون الرّضّع، وموافقة القاصر الناضج والتطعيم](https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/119-law-consent-immunization).



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

شرى (أرتكاريا)، أو صعوبة في التنفس، أو تورّم في الحنجرة أو اللسان أو الشفتين. إذا حدث هذا التفاعل، فإن مقدم الرعاية الصحية المتابع لك مستعد لعلاجك. يتضمن العلاج الطارئ إعطاء الإبينفرين (الأدرينالين)، والنقل بسيارة الإسعاف إلى أقرب قسم للطوارئ. إذا ظهرت الأعراض بعد مغادرة العيادة، اتصل على الرقم 1-1-9 أو برقم قسم الطوارئ المحلي. يجب أن تُبلغ مقدم الرعاية الصحية المتابع لك بالتفاعلات الخطيرة أو غير المتوقعة دائمًا.

من الذي ينبغي عليه عدم الحصول على لقاح المكورات الرئوية العديد السكاريد؟

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك إذا كنت أنت أو طفلك قد تعرضتما لتفاعل دوائي مُهدد للحياة لجراحة سابقة من لقاح المكورات الرئوية أو أي جزء من منه.

لا ينبغي أن يُعطى لقاح المكورات الرئوية العديد السكاريد للأطفال الذين لم يبلغوا من العمر عامين، وذلك لعدم فاعليته لصغار الأطفال؛ إذ يتلقى هؤلاء الأطفال لقاح المكورات الرئوية المقترن بدءًا من عمر شهرين.

لا حاجة لتأخير تلقي اللقاح بسبب الإصابة بالزكام أو أمراض بسيطة أخرى. ولكن إذا كانت لديك مخاوف تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك.

ما هي عدوى المكورات الرئوية؟

تتسبب البكتيريا/العقدية الرئوية في عدوى المكورات الرئوية. يمكن أن تسبب البكتيريا التهابات خطيرة تهدّد الحياة للبطانة التي تغطي الدماغ (السحايا)، والدم (تعفن الدم)، والرئتين (التهاب الرئة). تشمل المضاعفات الدائمة للالتهابات تلف الدماغ والصمم. من كل 20 حالة من التهاب السحايا بالمكورات الرئوية، يموت ما يصل إلى 5 أشخاص.

تنتقل عدوى المكورات الرئوية من شخص إلى آخر عن طريق السعال، أو العطاس، أو الاتصال القريب مع المريض وجهًا لوجه. يمكن كذلك أن تنتقل عن طريق اللعاب. على سبيل المثال، من خلال التقبيل أو مشاركة الطعام أو الشراب أو السجائر أو أحمر الشفاه أو زجاجات المياه أو وافي الفم الذي يستخدم في الرياضة أو أجزاء الآلات الموسيقية التي توضع بالفم.

لمزيد من مواضيع HealthLinkBC يُرجى زيارة www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files أو وحدة الصحة العامة المحلية في منطقتك. للحصول على المشورة ومعلومات صحية حول الحالات غير الطارئة في مقاطعة بريتش كولومبيا تفضّل بزيارة www.healthlinkbc.ca أو اتصل بالرقم 1-1-8 (مجانيًا). للصم وضعاف السمع، يرجى الاتصال بالرقم 1-1-7. تتوفر خدمة الترجمة بأكثر من 130 لغة عند الطلب.