

## جدول التطعيمات في كولومبيا البريطانية للبالغين وكبار السن والأشخاص المعرضين بشدة للأمراض

برنامج إدارة المخاطر المرتفعة <sup>+</sup>	65 عامًا فما فوق	الشخص البالغ	اللقاح
		<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">لقاح جدري الماء (الحمق)</a> <sup>1</sup> (#44b)
<input checked="" type="checkbox"/>			<a href="#">لقاح التهاب الكبد الوبائي من النوع أ</a> <sup>2</sup> (#33)
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">لقاح التهاب الكبد الوبائي ب</a> <sup>2</sup> (#25a)
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)</a> <sup>3</sup> (101b)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<a href="#">لقاح الإنفلونزا المعطل (الخامل)</a> <sup>4</sup> (#12d)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">اللقاح الثلاثي الفيروسي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)</a> <sup>5</sup> (14a)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">اللقاح المقترن للمكورات السحائية C</a> <sup>6</sup> (#23a)
<input checked="" type="checkbox"/>			<a href="#">اللقاحات الرباعية للمكورات السحائية</a> <sup>6</sup> (#23b)
<input checked="" type="checkbox"/>			<a href="#">لقاح المكورات الرئوية المتقارن (PCV 13)</a> <sup>6</sup> (#62a)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<a href="#">لقاح المكورات الرئوية العديد السكريد</a> <sup>6</sup> (#62b)
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">اللقاح الثنائي ضد الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا) (TD)</a> <sup>7</sup> (#18a)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">اللقاح الثلاثي المحسن (Tdap) ضد الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا) والسعال الديكي</a> <sup>8</sup> (#18c)

<sup>5</sup> ينبغي أن يأخذ أي شخص من مواليد عام 1970 فأكثر ممن لم يتلقَّ التطعيم أو ليس لديه مناعة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية جرعتين من لقاح (MMR) للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

<sup>6</sup> كذلك يُعطى اللقاح المتقارن للمكورات السحائية من الزمرة C مجاناً لمن ولدوا قبل العام 2002، والذين بلغوا 24 عاماً أو أقل دون أن يتلقوا جرعة من اللقاح في عامهم العاشر أو بعد ذلك.

<sup>7</sup> يُعطى لقاح الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا) Td للبالغين الذين لم يسبق لهم التطعيم أو من تعدد معرفتهم تاريخهم التطعيم. يُنصح بإعطاء جرعة منشطة من اللقاح كل 10 سنوات. إذا كان لديك خدش كبير أو جرح وكنت معرضاً بشدة للإصابة بعدوى الكزاز (التيتانوس) قد يكون من المستحسن تلقيك للقاح.

<sup>8</sup> يُعطى لقاح الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا) والسعال الديكي Tdap مجاناً للبالغين الذين لم يسبق لهم التطعيم في طفولتهم أو من تعدد معرفتهم تاريخهم التطعيم. يُنصح هؤلاء بأخذ اللقاح، ولكنه لا يُعطى مجاناً لـ: البالغون من العمر 18 عاماً فأكثر ممن سبق لهم التطعيم ضد السعال الديكي في طفولتهم ولكنهم لم يتلقوا لقاح يحتوي على لقاح السعال الديكي بعد البلوغ؛ والنساء خلال حملهن في كل مرة بغض النظر عن سجلهن التطعيم.

**ملاحظة:** يمكن لجدول التطعيمات أن يتغير. إذا كانت لديك أية استفسارات فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو اتصل بالرقم **8-1-1**. وُضع جدول التطعيمات وتمت مراجعته من قبل HealthLinkBC، ووزارة الصحة في كولومبيا البريطانية، ومركز كولومبيا البريطانية للسيطرة على الأمراض.

**برنامج إدارة المخاطر المرتفعة:** تقدم كولومبيا البريطانية العديد من اللقاحات المجانية لبعض الفئات من الأشخاص. على سبيل المثال، يمكن لمن يعاني من أمراض مزمنة أو ضعف جهاز المناعة تلقي لقاحات مجانية. اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو اتصل بالرقم **8-1-1** لمزيد من المعلومات.

<sup>1</sup> يوصى بإعطاء جرعتين من اللقاح للبالغين ممن لم يسبق لهم التطعيم. قد لا يحتاج بعض البالغين إلى اللقاح. إذا كنت قد أصبت بجدري الماء أو داء الهريس النطاقي (الحزام الناري) بعد بلوغك من العمر عاماً واحداً، وكان ذلك قبل عام 2004، أو تأكدت إصابتك من خلال فحص مخبري، فأنت لست بحاجة إلى اللقاح.

<sup>2</sup> يُعطى لقاح التهاب الكبد الوبائي ب مجاناً لمواليد عام 1980 فأكثر ممن لم يسبق لهم تلقي اللقاح أبداً أو أولئك الذين لم يتلقوا عدد الجرعات الموصى به لعمرهم.

<sup>3</sup> كما يُقدم لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) مجاناً للمستحقين البالغين 26 عاماً أو أقل.

<sup>4</sup> يُعطى لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير بسبب الإنفلونزا، كما يُعطى مجاناً لمن يمكنهم نقل الإنفلونزا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير.