

برنامه‌ی ایمن‌سازی برای نوزادان و کودکان بریتیش کلمبیا

شروع از 4 سالگی (ورود به کودکستان)	18 ماهگی	12 ماهگی	6 ماهگی	4 ماهگی	2 ماهگی	واکسن
		<input checked="" type="checkbox"/>				واکسن آبله مرغان (واریسل) ¹ (#44b)
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هیاتیت B، فلج اطفال، و هموفیلوس آنفلوانزای نوع b (#105)
	<input checked="" type="checkbox"/>					واکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزای نوع ب (#15b)
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			واکسن هیاتیت آ (#33) فقط برای کودکان بومیان
	<input checked="" type="checkbox"/>					واکسن آنفلوانزا واکسن آنفلوانزای غیر فعال ² (#12d) واکسن زنده تضعیف شده آنفلوانزا ² (#12e)
		<input checked="" type="checkbox"/>				واکسن سرخک، اوریون، سرخچه (MMR) (#14a)
<input checked="" type="checkbox"/>						واکسن سرخک، اوریون، سرخچه و آبله مرغان (MMRV) (#14e) ¹
		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن توأم مننگوکوک-سی (#23a)
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن دوگانه ینوموکوک (PCV 13) (#62a)
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن روتاویروس واکسن روتاویروس (روتاریکس®) (#104a) ³
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن روتاویروس (روتاتک®) (#104) ³
<input checked="" type="checkbox"/>						واکسن کزاز، دیفتری، سیاه سرفه، فلج کودکان (#15a)

2 ایمن‌سازی سالانه در برابر آنفلوانزا توصیه می‌شود و به رایگان به 6 ماهه تا 4 ساله ارائه می‌شود. برای کودکی که برای نخستین بار این واکسن را دریافت می‌کنند، نوبت دوم این واکسن به فاصله‌ی 4 هفته پس از نوبت اول توصیه می‌شود.

3 2 واکسن روتاویروس وجود دارد. بسته به واکسن داده شده، کودکان به 2 دوز (روتاریکس®) یا 3 دوز (روتاتک®) نیاز خواهند داشت.

توجه: برنامه‌ی واکسن‌ها ممکن است تغییر کند. اگر پرسشی دارید، با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید یا با شماره‌ی **1-1-8** تماس بگیرید. جدول ایمن‌سازی توسط هلت لینک‌بی‌سی (HealthLinkBC)، وزارت بهداشت بی‌سی، و مرکز کنترل بیماری بی‌سی تدوین و بازبینی شده است.

1 کودکی که بنا به تشخیص آزمایشگاه در 1 سالگی یا بعد از آن آبله مرغان یا زونا گرفته‌اند نیازی به واکسن آبله مرغان ندارند. این کودکان باید در سن 4 سالگی واکسن MMR را دریافت نمایند.