

Calendario de vacunación para bebés y niños de B.C.

Vacuna	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	Comenzando a los 4 años de edad (Al acceder al jardín de infancia)
<u>Vacuna contra la varicela</u> (#44b) ¹				<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b (DTaP-HB-IPV-Hib)</u> (#105)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<u>Vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b (DTaP-IPV-Hib)</u> (#15b)					<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>Vacuna contra la hepatitis A</u> (#33) Solo niños indígenas			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>Vacuna contra la influenza</u> <u>Vacuna desactivada contra la influenza (gripe)</u> (#12d) ² <u>Vacuna viva atenuada contra la influenza (gripe)</u> (#12e) ²				<input checked="" type="checkbox"/> Anualmente para niños entre 6 meses y 4 años de edad (La vacuna viva atenuada contra la influenza no está aprobada para su uso en niños menores de 2 años de edad)		
<u>Vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR)</u> (#14a)				<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Vacuna contra el sarampión, paperas, rubéola y varicela (SPRV)</u> (#14e) ¹						<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Vacuna meningocócica C conjugada (Men-C)</u> (#23a)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Vacuna conjugada contra el neumococo (Prevenar 13)</u> (#62a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Vacuna contra el rotavirus</u> <u>Vacuna contra el rotavirus (Rotarix®)</u> (#104a) ³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<u>Vacuna contra el rotavirus (RotaTeg®)</u> (#104) ³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<u>Vacuna contra el tétanos, difteria, tos ferina y poliomielitis (Tdap-IPV)</u> (#15a)						<input checked="" type="checkbox"/>

Nota: El calendario de vacunación puede cambiar. Hable con su proveedor de asistencia sanitaria, o llame al **8-1-1** si tiene dudas. Esta tabla de vacunación ha sido desarrollada y revisada por HealthLinkBC, el BC Ministry of Health (Ministerio de Salud de B.C.) y el BC Centre for Disease Control (Centro de control de enfermedades de B.C.).

¹ No es necesario que reciban la vacuna contra la varicela los niños que hayan contraído la varicela o el herpes zóster a la edad de un año o posteriormente, que haya sido confirmado por una

prueba de laboratorio, pero deben recibir la vacuna SPR (MMR, en inglés) a los 4 años de edad.

² La inmunización anual contra la influenza está recomendada y se administra de manera gratuita a niños de entre 6 meses y 4 años de edad. Los niños que reciban la vacuna por primera vez deben recibir dos dosis con 4 semanas de intervalo entre ellas.

³ Existen 2 vacunas contra el rotavirus. Dependiendo de la vacuna que se administre, los niños necesitarán recibir 2 dosis (Rotarix®) o 3 dosis (RotaTeg®).