

Lịch Chủng Ngừa cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em tại B.C.

Vắc-xin	2 Tháng tuổi	4 Tháng tuổi	6 Tháng tuổi	12 Tháng tuổi	18 Tháng tuổi	Bắt đầu lúc 4 Tuổi (Vào Mẫu giáo)
<u>Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Thủy Đậu (Trái Ra)</u> (#44b) ¹				<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Thuốc chủng ngừa Bạch hầu, Sởi uốn ván, Ho gà, Viêm gan B, Sốt bại liệt, và Trục khuẩn gây viêm màng não loại b (DTaP-HB-IPV-Hib)</u> (#105)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<u>Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Bạch Hầu, Sởi Uốn Ván, Ho Gà, Bại Liệt, Trục Khuẩn Gây Viêm Màng Não Loại b (DTaP-IPV-Hib)</u> (#15b)					<input checked="" type="checkbox"/>	
<u>Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Viêm Gan A</u> (#33) Chỉ dành cho trẻ em Bản địa			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Vắc-xin ngừa bệnh Cúm <u>Vắc-xin Cúm Bất hoạt</u> (#12d) ² <u>Vắc-xin Cúm Chứa Vi-rút Sống đã Suy yếu</u> (#12e) ²				<input checked="" type="checkbox"/> Hàng năm cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi (Vắc-xin cúm chứa vi-rút sống đã suy yếu không được phê duyệt để sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi)		
<u>Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sởi, Quai Bi, Sởi Đức (MMR)</u> (#14a)				<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sởi, Quai Bi, Sởi Đức và Thủy Đậu (MMRV)</u> (#14e) ¹						<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Thuốc Chủng Ngừa Liên Hợp Chống Bệnh Viêm Não Loại C (Men-C)</u> (#23a)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Thuốc Chủng Ngừa Liên Hợp Chống Khuẩn Cầu Phổi (PVC 13)</u> (#62a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Vắc-xin ngừa Vi-rút Rota <u>Vắc-xin ngừa Vi-rút Rota (Rotarix®)</u> (#104a) ³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<u>Thuốc Chủng Ngừa Rotavirus (RotaTeq®)</u> (#104) ³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<u>Thuốc Chủng Ngừa Sởi Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà, Bại Liệt (Tdap-IPV)</u> (#15a)						<input checked="" type="checkbox"/>

Lưu ý: Lịch chủng ngừa này có thể thay đổi. Hãy nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc gọi số **8-1-1** nếu bạn có thắc mắc. Bảng chủng ngừa này được soạn thảo và duyệt lại bởi HealthLinkBC, Bộ Y tế BC và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC.

¹ Những trẻ em đã bị bệnh thủy đậu hoặc bệnh gờ leo (shingles), được xác nhận bởi một xét nghiệm thực hiện trong phòng thí nghiệm, lúc 1 tuổi trở lên thì

không cần tiêm/chích vắc-xin ngừa bệnh thủy đậu, và nên tiêm/chích vắc-xin ngừa MMR lúc 4 tuổi.

² Chủng ngừa bệnh cúm thường niên được khuyến nghị và cung cấp miễn phí cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi. Những trẻ em được tiêm/chích vắc-xin này lần đầu tiên cần được tiêm/chích 2 liều cách nhau 4 tuần

³ Có 2 loại vắc-xin ngừa vi-rút rota. Tùy vào việc vắc-xin nào được tiêm/chích, trẻ em cần 2 liều (Rotarix®) hoặc 3 liều (RotaTeq®).