

جدول التطعيمات في بريتش كولومبيا للرضع والأطفال

تبدأ مع بلوغ 4 سنوات (دخول روضة الأطفال)	18 شهرًا	12 شهرًا	6 أشهر	4 أشهر	شهرين	اللقاح
		<input checked="" type="checkbox"/>				لقاح جديري الماء (الخُمَاق) (#44b)¹
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لقاح الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي من النوع ب وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب (DTaP-HB-IPV-Hib) (#105)
	<input checked="" type="checkbox"/>					اللقاح الخماسي المحسن ضد الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب (DTaP-IPV-Hib) (#15b)
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			لقاح التهاب الكبد الوبائي من النوع أ (#33) لأطفال السكان الأصليين فقط
	<input checked="" type="checkbox"/>					لقاح الإنفلونزا لقاح الإنفلونزا المعطل (الخامل) (#12d)² لقاح الإنفلونزا الموهن الحي (#12e)² سنويًا للرضع من سن 6 أشهر وحتى 4 سنوات (لا يُسمح بإعطاء لقاح الإنفلونزا الموهن الحي للأطفال الذين لم يبلغوا السنتين)
		<input checked="" type="checkbox"/>				اللقاح الثلاثي الفيروسي الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (MMR) (#14a)
<input checked="" type="checkbox"/>						لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجديري الماء (الخُمَاق) (MMRV) (#14e)¹
		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	اللقاح المتقارن للمكورات السحائية من النوع سي (Men-C) (#23a)
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لقاح المكورات الرئوية المتقارن (PCV 13) (#62a)
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لقاح الروتا (الفيروس العجلي) لقاح الروتا (الفيروس العجلي) (Rotarix®) (#104a)³
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لقاح الروتا (الفيروس العجلي) (RotaTeq®) (#104)³
<input checked="" type="checkbox"/>						اللقاح الرباعي المحسن ضد الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا) والسعال الديكي وشلل الأطفال (Tdap-IPV) (#15a)

³ هناك نوعان من لقاحات فيروس الروتا. وفقًا لنوع اللقاح المستخدم، يحتاج الأطفال إلى جرعتين من لقاح (Rotarix®) أو ثلاث جرعات من لقاح (RotaTeq®).

ملاحظة: يمكن أن يتغير جدول التطعيمات. إذا كانت لديك أية استفسارات فتحدّث مع مقدّم الرعاية الصحية الخاص بك أو اتصل بالرقم **8-1-1**. ساهمت HealthLinkBC، ووزارة الصحة في بريتش كولومبيا، ومركز مكافحة الأمراض في بريتش كولومبيا في وضع جدول التطعيمات ومراجعتها.

¹ لا يحتاج الأطفال الذين سبق لهم أن أصيبوا بجديري الماء أو الهربس النطاقي (الحزام الناري) عند سن عام فأكثر، بناءً على تأكيد الفحص المخبري، إلى لقاح جديري الماء، ولكن ينبغي عليهم أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) عند سن 4 سنوات.

² يوصى بإعطاء لقاح الإنفلونزا مرة سنويًا، وهو مجاني للأطفال من سن 6 أشهر وحتى 4 سنوات. على الأطفال الذين يتلقون اللقاح للمرة الأولى أخذ جرعتين يفصل بينهما 4 أسابيع