

جدول التطعيمات في كولومبيا البريطانية للرضع والأطفال

النقاح	شهران	4 أشهر	6 أشهر	12 شهرًا	18 شهرًا	تبدأ مع بلوغ 4 سنوات (دخول روضة الأطفال)
لقاح جدري الماء (الخماق) (#44b) ¹				<input checked="" type="checkbox"/>		
لقاح الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي من النوع ب وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب (DTaP-HB-IPV-Hib) (#105)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
اللقاح الخماسي المحسن ضد الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب (DTaP-IPV-Hib) (Hib) (#15b)					<input checked="" type="checkbox"/>	
لقاح التهاب الكبد الوبائي من النوع أ (#33) لأطفال السكان الأصليين فقط			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
لقاح الإنفلونزا لقاح الإنفلونزا المعطل (الخامل) (#12d) ² لقاح الإنفلونزا الموهن الحي (#12e) ²				<input checked="" type="checkbox"/>		لأطفال من سن 6 أشهر وحتى 4 سنوات (لا يُسمح بإعطاء لقاح الإنفلونزا الموهن الحي للأطفال الذين لم يبلغوا السنتين)
اللقاح الثلاثي الفيروسي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) (#14a)				<input checked="" type="checkbox"/>		
اللقاح الرباعي الفيروسي (MMRV) ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدري الماء (الخماق) (#14e) ¹					<input checked="" type="checkbox"/>	
اللقاح المقترن للمكورات السحائية C (#23a)				<input checked="" type="checkbox"/>		
لقاح المكورات الرئوية المتقارن (PCV 13) (#62a)				<input checked="" type="checkbox"/>		
لقاح الروتا (الفيروس العجلي) لقاح الروتا (الفيروس العجلي) (Rotarix®) (#104a) ³					<input checked="" type="checkbox"/>	
لقاح الروتا (الفيروس العجلي) روتا تك (RotaTeq®) (#104#) ³				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
اللقاح الرباعي المحسن ضد الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا) والسعال الديكي وشلل الأطفال (IPV-Tdap) (#15a)				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

² يوصى بإعطاء لقاح الإنفلونزا مرة سنويًا وهو مجاني للأطفال من سن 6 أشهر وحتى 4 سنوات. يوصى بإعطاء جرعة ثانية بعد مرور 4 أسابيع على أخذ الجرعة الأولى للأطفال الذين يتلقون لقاح الإنفلونزا للمرة الأولى.

³ هناك نوعان من لقاحات فيروس الروتا. وفقًا لنوع اللقاح المستخدم، يحتاج الأطفال إلى جرعتين من لقاح (Rotarix®) أو ثلاث جرعات من لقاح (RotaTeq®).

ملاحظة: يمكن لجدول التطعيمات أن يتغير. إذا كانت لديك أية استفسارات فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو اتصل بالرقم 1-8-1-8. وضع جدول التطعيمات وتمت مراجعة من قبل HealthLinkBC، ووزارة الصحة في كولومبيا البريطانية، ومركز كولومبيا البريطانية للسيطرة على الأمراض.

¹ لا يحتاج الأطفال الذين سبق لهم أن أصيبوا بجدري الماء أو الهربس النطاقي (الحزام الناري) عند سن عام فأكثر، بناءً على تأكيد الفحص المخبري، إلى لقاح جدري الماء، ولكن ينبغي عليهم أخذ اللقاح الثلاثي المحسن الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) عند سن 4 سنوات.