

Le programme de vaccination de la Colombie-Britannique, enfants et nourrissons

Vaccin	2 mois	4 mois	6 mois	12 mois	18 mois	À partir de 4 ans (entrée à la maternelle)
<b>Le vaccin contre la varicelle</b> (n° 44b) <sup>1</sup>				<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et l'haemophilus influenzae de type b (DTCa-HB-VPI-Hib)</b> (n° 105)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la polio et l'Haemophilus influenzae de type b (DCaT-VPI-Hib)</b> (n° 15b)					<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Le vaccin contre l'hépatite A</b> (n° 33) Enfants autochtones seulement			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Vaccin contre l'influenza</b> <b>Vaccin inactivé contre l'influenza (grippe)</b> (n° 12d) <sup>2</sup> <b>Le vaccin vivant atténué contre la grippe</b> (n° 12e) <sup>2</sup>				<input checked="" type="checkbox"/> Enfants de six mois à quatre ans (Il n'est pas recommandé d'administrer le vaccin vivant atténué contre la grippe aux enfants de moins de 2 ans)		
<b>Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR)</b> (n° 14a)				<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Le vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle (RROV)</b> (n° 14e) <sup>1</sup>						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Le vaccin conjugué contre le méningocoque C (Men C)</b> (n° 23a)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Le vaccin conjugué contre le pneumocoque (VCP-13)</b> (n° 62a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Vaccin contre le rotavirus</b> <b>Le vaccin contre le rotavirus (Rotarix®)</b> (n° 104a) <sup>3</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Le vaccin contre le rotavirus (RotaTeq®)</b> (n° 104) <sup>3</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Le vaccin (DTCa-VPI) contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio</b> (n° 15a)						<input checked="" type="checkbox"/>

Remarque : Le programme de vaccinations peut changer. Pour toute question, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé ou appelez le **811**. Ce tableau des vaccinations a été élaboré et révisé par HealthLinkBC, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique et le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique.

<sup>1</sup> Les enfants qui ont eu la varicelle ou un zona à l'âge d'un an ou plus, selon le résultat d'un test de laboratoire, n'ont pas besoin du vaccin contre la varicelle et ils devraient recevoir le vaccin ROR à l'âge de 4 ans.

<sup>2</sup> Il est recommandé de se faire vacciner chaque année contre la grippe. Ce vaccin est offert gratuitement aux enfants de 6 mois à 4 ans. Si l'enfant se fait administrer un vaccin contre la grippe pour la première fois, la seconde dose devrait être administrée 4 semaines après la première.

<sup>3</sup> Il existe deux vaccins contre le rotavirus. En fonction du vaccin qui est administré, les enfants ont besoin de deux doses (Rotarix®) ou de trois doses (RotaTeq®).