

برنامه‌ی ایمن‌سازی برای نوزادان و کودکان بریتیش کلمبیا

واکسن	2 ماهگی	4 ماهگی	6 ماهگی	12 ماهگی	18 ماهگی	شروع از 4 سالگی (ورود به کودکستان)
واکسن آبله مرغان (واریسلا) ¹ (#44b)				<input checked="" type="checkbox"/>		
واکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت B، فلج اطفال، و هموفیلوس آنفلوانزای نوع b (#105)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
واکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت B، فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزای نوع B (#15b)	<input checked="" type="checkbox"/>					
واکسن هپاتیت آ (#33) فقط برای کودکان بومیان	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
واکسن آنفلوانزا واکسن آنفلوانزای غیر فعال ² (#12d) واکسن آنفلوانزای (فلو) زنده ضعیف شده ² (#12e)				<input checked="" type="checkbox"/>		برای کودکان 6 ماهه تا 4 ساله (واکسن آنفلوانزای زنده ضعیف شده برای استفاده‌ی کودکان زیر 2 تصویب نشده است)
واکسن سرخک، اوریون، سرخچه (MMR)(#14a)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
واکسن سرخک، اوریون، سرخچه و آبله مرغان (MMRV)(#14e) ¹	<input checked="" type="checkbox"/>					
واکسن توأم مننگوکوک-سی (#23a)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
واکسن دوگانه پنوموکوک (PCV 13) (#62a)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
واکسن روتاویروس واکسن روتاویروس (روتاریکس®) (#104a) ³				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
واکسن روتاویروس (روتاتیک®) (#104) ³			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
واکسن کزاز، دیفتری، سیاه سرفه، فلج کودکان (#15a)	<input checked="" type="checkbox"/>					

² ایمن‌سازی سالانه در برابر آنفلوانزا توصیه می‌شود و به رایگان به 6 ماهه تا 4 ساله ارائه می‌شود. برای کودکانی که برای نخستین بار این واکسن را دریافت می‌کنند، نوبت دوم این واکسن به فاصله‌ی 4 هفته پس از نوبت اول توصیه می‌شود.

³ دو نوع واکسن روتاویروس وجود دارد. کودکان بسته به نوع واکسن تزریق شده، ۲ نوبت (روتاریکس®) یا سه نوبت (روتاتیک®) واکسن نیاز دارند.

توجه: برنامه‌ی واکسن‌ها ممکن است تغییر کند. اگر پرسشی دارید، با مراقب‌گر بهداشتی خود صحبت کنید یا با شماره‌ی 1-1-8 تماس بگیرید. جدول ایمن‌سازی توسط هلت لینک‌بی‌سی (HealthLinkBC)، وزارت بهداشت بی‌سی، و مرکز کنترل بیماری بی‌سی تدوین و بازبینی شده است.

¹ کودکانی که بنا به تشخیص آزمایشگاه در 1 سالگی یا بعد از آن آبله مرغان یا زونا گرفته‌اند نیازی به واکسن آبله مرغان ندارند. این کودکان باید در سن 4 سالگی واکسن MMR را دریافت نمایند.