

BC 주 예방접종 일정 - 영유아 및 소아

백신	2 개월	4 개월	6 개월	12 개월	18 개월	만 4 세부터 (유치원 입학)
수두 예방접종(#44b) ¹						
디프테리아, 파상풍, 백일해, B 형 간염, 소아마비 및 b 형 헤모필루스 인플루엔자 (DTaP-HB-IPV-Hib) 백신 (#105)						
디프테리아, 파상풍, 백일해, 소아마비 및 b 형 헤모필루스 인플루엔자 (DTaP-IPV-Hib) 백신 (#15b)						
A 형 간염 예방접종 (#33) 원주민 아동만						
인플루엔자 백신 비활성화 인플루엔자(독감) 백신 (#12d) ² 약독화 인플루엔자(독감) 생백신 (#12e) ²						
생후 6 개월 - 만 4 세 아동 매년 접종 (약독화 인플루엔자 생백신의 경우, 만 2 세 미만 아동에 대한 사용은 승인되지 않음)						
홍역, 볼거리, 풍진(MMR) 백신 (#14a)						
홍역, 볼거리, 풍진 및 수두(MMRV) 백신 (#14e) ¹						
C 형 수막구균 단백질결합(Men-C) 예방접종(#23a)						
폐구균 단백질결합(PCV 13) 백신 (#62a)						
로타바이러스 백신 로타바이러스 백신 (Rotarix®) (#104a) ³						
로타바이러스 백신 (RotaTeq®)(#104) ³						
파상풍, 디프테리아, 백일해 및 소아마비(Tdap-IPV) 백신 (#15a)						

주의: 이 예방접종 일정은 변경될 수 있습니다. 의문이 있을 경우, 보건 의료 서비스 제공자에게 문의하거나 전화 **8-1-1** 로 문의하십시오. 이 예방접종표는 HealthLinkBC, BC 주 보건부(BC Ministry of Health) 및 BC 주 질병통제센터(BC Centre for Disease Control)가 개발 및 검토한 것입니다.

¹ 만 1 세 이후 실험실 검사에서 확인된 수두 또는 대상포진을 앓은 적이 있는 아동은 수두 예방접종을 맞을 필요가 없으며 만 4 세에 MMR 예방접종을 맞아야 합니다.

² 연례 인플루엔자 예방접종은 생후 6 개월 - 만 4 세 아동에게 권장되며 무상으로 제공됩니다. 인플루엔자 예방접종을 처음 맞는 아동은 1 차 접종일로부터 4 주 후에 2 차 접종을 맞는 것이 바람직합니다.

³ 로타바이러스 백신은 두 가지가 있습니다. 투여된 백신의 종류에 따라 2 차 접종(Rotarix®) 또는 3 차 접종(RotaTeq®)을 맞아야 합니다.